



Riktlinje avseende "Borrelios hos häst" (2012/04) från Hästsektionens normgrupp antagen 2012, reviderad 2020 samt 2023/02).

Smittämnet återfinns i fästingar i Sverige. *Borrelia* infekterar hästar i Sverige och i många andra länder, vilket har visats genom en relativt hög seroprevalens. Dock har man inte lyckats framkalla sjukdomen i infektionsförsök. Smittämnet har påvisats i hästar vid försöksinfektion, men inga patologiska förändringar kunde knytas till fynden. Samband mellan exponering (seropositivitet) och sjukdomstecken har inte heller kunnat visas och många friska hästar är seropositiva. Att ställa diagnos med påvisande av antikroppar kan inte anses vara korrekt, då undersökningar visar att många hästar bär på antikroppar mot *borrelia* utan att det kan kopplas till något symptom.

Sällsynta fall av neuroborrelios, uveit och kutant lymfom som associerats till *Borrelia burgdorferi* infektion finns beskrivna hos häst. I samtliga sjukdomsfall är dock en pre-mortem diagnos mycket svår att fastställa.

Sammantaget innebär detta att det idag inte finns stöd för antibiotikabehandling mot borrelios hos häst baserat på serologi.

Referens: SVA.se